

給!給!給!

# 大方的壯漢



林業試驗所生態感測展示平台  
<http://iesn.tfri.gov.tw>

*Babina adenopleura*

腹斑蛙

*Babina adenopleura*

---

體態中型肥碩，有不明顯的背中線，  
雄性前腳兩側肩後方各有一塊三角型  
肩腺隆起。個性大方，常聚在一起高  
聲唱歌，大老遠就可聽到【給-給-給】  
的叫聲。

體長：公蛙6~7公分，母蛙6~7公分。

繁殖期：3~9月。

分布：全台2,000公尺以下山區草澤及  
靜水區域。

---



時尚教父



*Dutaphrynus melanostictus*

黑眶蟾蜍



林業試驗所生態感測展示平台  
<http://iesn.tfri.gov.tw>

*Duttaphrynus melanostictus*

體態中大型肥胖，眼睛周圍有突出的骨質稜脊，好像戴了黑鏡框一般。鼓膜大而明顯，後有一對膨大突出的耳後腺，遇到危險時可放出毒液。其外表皮膚粗糙，布滿疣粒，趾端黑色，像塗了黑指甲油。

體長：公蛙5~8公分，母蛙6~10公分。

繁殖期：2~9月。

分布：全台1,000公尺以下開闊之地，例如草地及公園路燈下。





林業試驗所生態感測展示平台  
<http://iesn.tfri.gov.tw>



三角飯團  
海苔口味



黑蒙西氏小雨蛙  
*Microhyla heymonsi*

*Microhyla heymonsi*

---

體態嬌小，呈三角型，長得很像可食用的三角飯糰。有背中線，其旁有一至二對黑色小括弧斑。鳴叫時會鼓起像身體一般大的單鳴囊，叫聲宏亮，想不注意他都很難。

體長：公蛙2~3公分，母蛙2~3公分。

繁殖期：3~9月。

分布：台灣中南部及東部1,500公尺以下，水邊草叢及落葉堆中。

---



美麗的舞者



莫氏樹蛙  
*Rhacophorus molreichti*



林業試驗所生態感測展示平台  
<http://iesn.tfri.gov.tw>

*Rhacophorus moltrechti*

---

體態中小型，整體呈美麗的墨綠色配上虹膜橘紅色的大眼，為台灣最常見的綠色樹蛙。腳上有吸盤利於爬樹，後肢股部內側呈橘紅色並散布有黑斑，跳起時會讓人嚇一跳呢。

體長：公蛙4~5公分，母蛙5~6公分。

繁殖期：1~12月。

分布：全台2,500公尺以下山區及丘陵。

---



# 水陸兩棲



斯文豪氏赤蛙

*Odorrana swinhoana*



林業試驗所生態感測展示平台  
<http://iesn.tfri.gov.tw>

*Odorrana swinhoana*

---

體態大型修長，背部呈褐色、綠褐色交雜，好像穿了迷彩服。趾端膨大成吸盤，讓牠可以在溪流來去自如，叫聲為【啾】的單音，非常響亮，讓人誤以為是鳥叫，因此有鳥蛙之稱。

體長：公蛙6~7公分，母蛙7~9公分。

繁殖期：1~12月。

分布：全台2,000公尺以下的山澗及溪流。

---





# 布氏樹蛙

*Polypedates brweri*



林業試驗所生態感測展示平台  
<http://iesn.tfri.gov.tw>

*Polypedates braueri*

---

體態呈中大型，背部多數有深色條紋或斑點，腳上有吸盤很會爬樹，後肢股部有黑白相間的網狀花紋，像穿了絲襪一樣。叫聲宏亮，為【叩叩叩叩...】，好像在敲門般。體長：公蛙5~6公分，母蛙6~7公分。繁殖期：3~9月。分布：全台1,000公尺以下山區及丘陵。

---





珍貴稀有保育類野生動物

大型草食動物，雄性具有三叉的長角，體重可達200公斤。蹄尖而硬，能適應崎嶇的地形，常見在有水源的地方活動，喜愛泥浴。主要分布在中央山脈中、高海拔，但在低山區也會出現。





# 臺灣水鹿

*Rusa unicolor*

珍貴稀有保育類野生動物




<http://iesn.tfri.gov.tw> 林業試驗所生態感測展示平台





瀕臨絕種保育類野生動物

外觀看起來就像一隻虎斑貓，但是耳後有明顯的白斑，尾部也較短。牠們的數量稀少，零星分布於苗栗至嘉義的低海拔淺山，這種美麗的貓科動物面臨棲地被開發、道路切割及獵捕壓力而亟待保護。





# 石 虎

*Prionailurus bengalensis*

瀕臨絕種保育類野生動物



<http://iesn.tfri.gov.tw> 林業試驗所生態感測展示平台





珍貴稀有保育類野生動物

**背**部有條紋、體側為斑點，尾部則有明顯的黑白相間環節。因肛門附近有泌香腺體而得名。夜行性，以果實與小動物為食。牠們主要棲息於低海拔地區，中高海拔偶爾可見，偏好高芒草、灌叢地或林緣。





# 麝香貓

*Viverricula indica*

珍貴稀有保育類野生動物



<http://iesn.tfri.gov.tw> 林業試驗所生態感測展示平台





珍貴稀有保育類野生動物

外型十分奇特；巨大的前爪用來挖掘蟻窩，並以細長、達20公分左右的舌頭舔食白蟻與螞蟻，牙齒已退化消失。牠們的動作較慢，遇危險則全身蜷曲成球狀以禦敵；主要棲息於低海拔的灌叢與森林。





# 穿山甲

*Manis pentadactyla*

珍貴稀有保育類野生動物



---

<http://iesn.tfri.gov.tw> 林業試驗所生態感測展示平台





**體**色棕黃，四肢與頭部較黑，雄性有短角，大約5月間脫落重長。  
以樹葉、禾草、果實為食，警戒時會發出淒厲的叫聲，略似狗吠。  
棲息於全島低至高海拔山區，算是森林中數量較多的野生動物。





山 羌

*Muntiacus reevesi*



---


<http://iesn.tfri.gov.tw> 林業試驗所生態感測展示平台





珍貴稀有保育類野生動物

**雄**鳥的羽色十分艷麗，全身為光彩閃耀的深藍、紅、綠、紫與雪白相間，雌鳥則為斑駁的茶色，腳脛鮮紅。牠們是台灣特有的雉雞，棲息於中低海拔林區，習性安靜隱密，喜歡在晨昏或起霧時活動。





# 藍腹鸚

*Lophura swinhoii*

珍貴稀有保育類野生動物



---


<http://iesn.tfri.gov.tw> 林業試驗所生態感測展示平台



環境 ■ 多出現於日照強烈的開闊環境，適應力強，尤其對土壤貧瘠的環境容忍力高。林道及產業道路兩旁邊坡，及中低海拔山頂開闊環境常見。

分布 ■ 台灣全島海拔 250~2,700公尺的山區，北部分布較多。

習性 ■ 大型常綠灌木



*Rhododendron oldhamii*



# 金毛杜鵑

*Rhododendron oldhamii*



林業試驗所生態感測展示平台  
<http://iesn.tfri.gov.tw>



**環境** ■ 多出現於日照充足的生育地，在乾旱及土壤貧瘠的環境也可生長，但不耐寒。

**分布** ■ 中國華北南部至華南地區一帶及越南北部，海拔80~1,800公尺的山坡、平原或山谷中。台灣北部、中部中海拔500~1,000公尺地區。

**習性** ■ 喬木



*Pyrus calleryana*



梨

梨

*Pyrus calleryana*



林業試驗所生態感測展示平台  
<http://iesn.tfri.gov.tw>





環境 ■ 多生長於陽光充足，  
土壤及空氣濕度適中  
的環境。

分布 ■ 熱帶、亞熱帶地區，  
台灣非其原產地。

習性 ■ 多年生大型草本



*Etlingera elatior*



火炬薑

*Etilingera elatior*



林業試驗所生態感測展示平台  
<http://iesn.tfri.gov.tw>



環境 ■ 多生長於山坡及河谷兩旁林地環境，耐寒，適應性強。

分布 ■ 中國大陸華北南部至華南地區一帶及日本

習性 ■ 灌木



*Cerasus glandulosa*



# 重瓣麥李

*Cerasus glandulosa*



林業試驗所生態感測展示平台  
<http://iesn.tfri.gov.tw>






環境 ■ 多出現在河岸兩旁的岩石隙縫中

分布 ■ 原生育地僅分布於臺灣北部新店溪上游的北勢溪，海拔100~300公尺的溪畔，以乾溝、水潭為主要分布中心，但現在野外可能已絕跡。

習性 ■ 常綠小灌木



*Rhododendron kanehirai*



# 烏來杜鵑

*Rhododendron kanehirai*

林業試驗所生態感測展示平台  
<http://iesn.tfri.gov.tw>





環境 ■ 多生長於半日照潮濕環境

分布 ■ 分布於中國、日本及琉球，台灣非原產地，但各地皆有種植。

習性 ■ 常綠灌木



*Camellia sasanqua*



# 茶 梅

*Camellia sasanqua*



林業試驗所生態感測展示平台  
<http://iesn.tfri.gov.tw>






環境 ■ 多生長在半日照之低海拔森林內，溪谷兩岸或林道旁亦可見。

分布 ■ 恆春半島、屏東壽卡、歸田、牡丹、南仁山、台東大武等低海拔地區。

習性 ■ 多年生常綠蔓性灌木



*Medinilla formosana*



# 台灣野牡丹藤

*Medinilla formosana*



林業試驗所生態感測展示平台  
<http://iesn.tfri.gov.tw>






**環境** ■ 生長之基底土質為富含有機質之黏土或壤土，溫暖且日照良好的水域環境。

**分布** ■ 分布於南俄羅斯、中亞、西亞、印度、中國、日本、北美等溫帶至亞熱帶地區。

**習性** ■ 多年生挺水型水生植物，會落葉。



*Nelumbo nucifera*



荷 花

*Nelumbo nucifera*



林業試驗所生態感測展示平台  
<http://iesn.tfri.gov.tw>






環境■ 多生長於森林和灌木或草  
生地的交界處

分布■ 恆春半島的低海拔山區

習性■ 大灌木，甚至可長成小  
喬木。



*Millettia pulchra* var. *microphylla*



# 小葉魚藤

*Millettia pulchra* var. *microphylla*



林業試驗所生態感測展示平台  
<http://iesn.tfri.gov.tw>





環境 ■ 多生長在溫暖潮濕的山區

分布 ■ 北台灣低海拔山區

習性 ■ 多年生大型草本



*Alpinia tonrokuensis*



桃月鹿屯

*Alpinia tonrokuensis*

林業試驗所生態感測展示平台  
<http://iesn.tfri.gov.tw>



環境 ■ 多生長於高溫、日照強烈的河濱或濱海地區。

分布 ■ 台灣南部及北部海岸、馬來西亞、澳洲及太平洋諸島。

習性 ■ 常綠中喬木



*Barringtonia racemosa*



# 水茄苳


*Barringtonia racemosa*



林業試驗所生態感測展示平台  
<http://iesn.tfri.gov.tw>



- 環境 ■ 生長於中低海拔闊葉森林  
分布 ■ 蓮華池森林、東眼山森林。  
習性 ■ 全寄生植物



*Mitrastemon kanehirai*



# 菱形如草

*Mitrastemon kanehirai*



林業試驗所生態感測展示平台  
<http://iesn.tfri.gov.tw>

